

Dénomination du médicament

**SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer**  
**Chlorhydrate de tétracaïne**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre pharmacien.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ?
3. Comment prendre SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : PREPARATIONS POUR LA GORGE - code ATC : R02AA20

Ce médicament contient un anesthésique d'action locale (il soulage la douleur). Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes, de petites plaies de la bouche.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ?**

**Ne prenez jamais SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer :**

- en cas d'allergie connue aux anesthésiques locaux ou aux autres composants du comprimé.

### **Mises en garde spéciales**

- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (« avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments. Il est donc impératif :
  - de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,
  - de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
- L'usage prolongé, plus de 5 jours, de ce médicament n'est pas souhaitable.
- Respectez la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur.
- L'apport calorique par comprimé est de 2,84 kilo-calories.

### **Précautions d'emploi :**

#### **Mal de gorge :**

- Il est nécessaire de consulter votre médecin dans les cas suivants :
  - survenue de fièvre
  - expectorations (crachats) purulentes
  - une gêne à la déglutition des aliments
  - aggravation ou absence d'amélioration au bout de 5 jours

#### **Aphtes, petites plaies de la bouche :**

En cas de lésions étendues, d'extension de lésions, d'apparition de fièvre, consultez immédiatement votre médecin.

## **Autres médicaments et SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer**

Ce médicament contient un anesthésique local (chlorhydrate de tétracaïne). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie)

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### **SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer avec des aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament. L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

### **Sportifs**

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer contient du saccharose et du sorbitol.**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient un sucre (le saccharose) qui se décompose en fructose et en glucose. Les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase / isomaltase (maladies héréditaires rares) ne doivent pas prendre ce médicament.

Ce médicament contient 0,7 g de saccharose par comprimé. Il faut en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

Ce médicament contient 150 mg de sorbitol par comprimé. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament.

## **3. COMMENT PRENDRE SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ?**

### **Posologie**

**Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.**

- Adultes : 6 à 8 comprimés à sucer par jour en espaçant les prises d'au moins 1 heure.

- Enfants de 6 à 15 ans : 2 à 4 comprimés à sucer par jour en espaçant les prises d'au moins 2 heures.

### **Mode d'administration**

VOIE BUCCALE.

Pour obtenir un contact prolongé avec les muqueuses, sucer lentement les comprimés sans les croquer, ni les avaler.

Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson et d'espacer les prises d'au moins 1 heure chez les adultes et de 2 heures chez les enfants.

### **Durée de traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

**Si vous avez pris plus de SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer que vous n'auriez dû**

Arrêter le traitement et consulter votre médecin.

**Si vous oubliez de prendre SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer**

Sans objet.

**Si vous arrêtez de prendre SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- réactions allergiques aux anesthésiques locaux, dans ce cas, arrêtez le traitement ;
- engourdissement passager de la langue ;
- en cas de fausse route (« avaler de travers »), il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander avis à un médecin.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

**Ce que contient SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer**

- La substance active est :

Chlorhydrate de tétracaïne..... 0,2 mg

- Les autres composants sont : saccharose, sorbitol, silice colloïdale anhydre, arôme menthe (menthol, gomme arabique), nébulisat de gomme arabique, povidone, stéarate de magnésium.

**Qu'est-ce que SOLUTRICINE MAUX DE GORGE TETRACAINE 0,2 mg, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à sucer en boîtes de 24 ou 36.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**SANOFI-AVENTIS FRANCE**  
82 AVENUE RASPAIL  
94250 GENTILLY

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**SANOFI-AVENTIS FRANCE**  
82 AVENUE RASPAIL  
94250 GENTILLY

**Fabricant**

**A. NATTERMANN & CIE GMBH**  
NATTERMAN ALLÉE 1  
D 50829 COLOGNE  
ALLEMAGNE

Ou

**SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.**

35-233 RZESZOW

POLOGNE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Sans objet.